

## HD 軟膏

### ●処方

キシロカインゼリー	30 mL
ハッカ油	1 mL
レスタミン軟膏	全量 100 g

### ●調整法

キシロカインゼリーとハッカ油を容器にとり、よく混和する。そこにレスタミン軟膏を徐々に加え全質均等とする。

### ●貯法

冷所保存

### ●有効期間

製造から2ヶ月、2ヶ月以内でも変色したものは廃棄

### ●適応

透析患者用のかゆみ止め

### ●用法・用量

1日数回、患部に適量塗布

### ●参照価格

容器代30円

## 5%ヒドロキノン（ハイドロキノン）軟膏

### ●処方

ヒドロキノン試薬	5 g
エタノール	適量
流動パラフィン	適量
アスコルビン酸	1 g
亜鉛華（10%）単軟膏	95 g

### ●調整法

ヒドロキノン（ハイドロキノン）を乳鉢にとりエタノールを加えて再結晶化させる。そこへアスコルビン酸を加え、更に流動パラフィンを加え良く混和する。泥状になったら亜鉛華（10%）単軟膏を徐々に加え、ダマにならないように混和し全質均等とする。

### ●貯法

遮光して冷所保存

### ●有効期間

製造から2ヶ月、2ヶ月以内でも変色したものは廃棄

### ●適応

肝斑、リール黒皮などの難治性色素沈着症

### ●用法・用量

1日1回、患部に適量を夜間に塗布、翌朝おとすこと

### ●備考

アスコルビン酸の添加はヒドロキノンの酸化防止のため。  
眼周囲及び開放創には使用しない

### ●参照価格

20gで500円（容器代込み、消費税は含まない）

## ホーリン V 軟膏

### ●処方

ホーリン V 膾用錠	1 錠
プロピレングリコール	適量
親水クリーム	全量 10 g

### ●調整法

ホーリン V 膾用錠を乳鉢にとり、よく粉砕し微細末とする。それにプロピレングリコールを適量（1～2 適）加え研和する。親水クリームを徐々に加え、ダマにならないように混和し全質均等とする。

### ●貯法

冷所保存

### ●有効期間

製造から 2 ヶ月、2 ヶ月以内でも変色したものは廃棄

### ●適応

子宮膾部びらん

### ●用法・用量

1 日 1 回、患部に適量塗布

### ●参照価格

容器代 30 円

## 塩化アルミニウム20%液

### ●処方

塩化アルミニウム	20 g
ホウ砂	0.8 g
精製水	全量 100 mL

### ●調整法

精製水約60 mLに塩化アルミニウム及びホウ砂を加え充分にかき混ぜる。完全に溶解したことを確認したら残余の精製水を加え、ろ過して製する。

### ●貯法

冷所保存

### ●有効期間

製造から2ヶ月、2ヶ月以内でも変色したものは廃棄

### ●適応

腋臭、多汗症

### ●用法・用量

1日1回、患部に適量塗布

### ●参照価格

20%、10%とも150 mLで1200円（容器代込み、消費税は含まない）

### ●備考

塩化アルミニウム10%液が処方されることあり。その際には塩化アルミニウム、ホウ砂とも半量を秤量すること。